



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)

**Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц,
получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в
иностранных государствах по специальности
«Стоматология детская»**

Некариозные поражения

Задание №1

При каком заболевании прорезывается один или два зуба измененной формы?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	флюороз
2)	системная гипоплазия;
3)	местная гипоплазия
4)	тетрациклиновые зубы
5)	синдром Стептона-Капдепона

Задание №2

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	эрозия зубов
2)	зубы Турнера
3)	клиновидные дефекты зубов
4)	флюороз
5)	зубы Фурнье

Задание №3

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	местная гипоплазия
2)	патологическая стираемость
3)	гиперестезия

4)		клиновидные дефекты
5)		флюороз

Задание №4

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		зубы Турнера
2)		патологическая стираемость
3)		некроз зубов
4)		эрозии эмали
5)		зубы Пфлюгера

Задание №5

Каковы клинические формы гипоплазии?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		деструктивная
2)		чашеобразная
3)		штриховая
4)		ямочная
5)		меловидно-крапчатая

Задание №6

Какие клинические формы характерны для гипоплазии?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		пятнистая
2)		чашеобразная
3)		штриховая
4)		бороздчатая
5)		волнистая

Задание №7

Локализация участков поражения на поверхности зубов при гипоплазии наиболее достоверно указывает на:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		тяжесть перенесенного заболевания
2)		вид заболевания
3)		частоту заболеваний
4)		длительность заболевания

5)	возраст, в котором происходило нарушение минерального обмена
----	--

Задание №8

Причинами системной гипоплазии временных зубов могут являться:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	заболевания ребенка на 2-3-м году жизни
2)	болезни матери в течение беременности
3)	травма молочных зубов
4)	искусственное вскармливание ребенка
5)	гестоз второй половины беременности

Задание №9

Площадь поражения вестибулярной поверхности зубов при гипоплазии наиболее достоверно указывает на:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	длительность заболевания.
2)	вид заболевания
3)	время возникновения заболевания
4)	тяжесть перенесенного заболевания

Задание №10

Зубы Пфлюгера являются разновидностью:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	системной гипоплазии
2)	местной гипоплазии
3)	наследственных нарушений твердых тканей зубов
4)	лекарственных поражений
5)	очаговой гипоплазии

Задание №11

Причинами возникновения системной гипоплазии постоянных зубов могут являться:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	гестоз беременности
2)	эндокринные заболевания матери
3)	заболевания ребенка в первый год жизни
4)	прием лекарственных препаратов в первые годы жизни

Задание №12

Причиной возникновения системной гипоплазии постоянных первых моляров и резцов является:

.		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		гестоз второй половины беременности
2)		гестоз первой половины беременности
3)		заболевания ребенка в первый год жизни
4)		прием тетрациклина
5)		несращение твердого неба.

Задание №13		
В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных факторов вероятнее всего приведет к поражению жевательной поверхности премоляров и вторых моляров?		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от 1 года до 3 лет
2)		от 3 до 4 лет
3)		до 1 года
4)		в период внутриутробного развития
5)		в 7-8 лет

Задание №14		
В патогенезе гипоплазии ведущим фактором является:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		демнерализация
2)		дисминерализация
3)		разрушение белков эмали
4)		все перечисленное верно

Задание №15		
Причиной возникновения системной гипоплазии временных зубов является:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		гестоз второй половины беременности
2)		гестоз первой половины беременности
3)		заболевания ребенка в первый год жизни
4)		прием тетрациклина
5)		несращение твердого неба

Задание №16		
Зубы Гетчинсона являются разновидностью:		

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)	<input type="checkbox"/>	системной гипоплазии
2)	<input type="checkbox"/>	местной гипоплазии
3)	<input type="checkbox"/>	наследственных нарушений твердых тканей зубов
4)	<input type="checkbox"/>	лекарственных поражений
5)	<input type="checkbox"/>	очаговой гипоплазии

Задание №17		
Симптомом врожденного сифилиса являются:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)	<input type="checkbox"/>	зубы Гетчинсона
2)	<input type="checkbox"/>	зубы Турнера
3)	<input type="checkbox"/>	зубы Пфлюгера
4)	<input type="checkbox"/>	зубы Фурнье
5)	<input type="checkbox"/>	микроденития

Задание №18		
Какие зубы наиболее часто поражаются системной гипоплазией:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)	<input type="checkbox"/>	временные моляры и резцы
2)	<input type="checkbox"/>	постоянные моляры и резцы
3)	<input type="checkbox"/>	постоянные первые клыки
4)	<input type="checkbox"/>	временные резцы
5)	<input type="checkbox"/>	постоянные премоляры

Задание №19		
В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных факторов вероятнее всего приведет к поражению режущего края резцов и жевательной поверхности первых моляров:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)	<input type="checkbox"/>	от 1 года до 3 лет
2)	<input type="checkbox"/>	от 3 до 4 лет
3)	<input type="checkbox"/>	до 1 года
4)	<input type="checkbox"/>	в период внутриутробного развития
5)	<input type="checkbox"/>	в 7-8 лет

Задание №20		
Наиболее эффективными методами лечения чашеобразной формы системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		

1)		протезирование керамическими коронками
2)		протезирование пластмассовыми коронками
3)		реставрация композиционными материалами
4)		пломбирование стеклоиономерными цементами
5)		реставрация компомерами

Задание №21

Наиболее эффективными методами лечения пятнистой формы системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		микроабразия
2)		реминерализующая терапия
3)		реставрация композиционными материалами
4)		пломбирование стеклоиономерными цементами
5)		реставрация компомерами

Задание №22

Наиболее эффективными методами лечения бороздчатой формы системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются:

.

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		протезирование керамическими коронками
2)		реминерализующая терапия
3)		реставрация композиционными материал
4)		пломбирование стеклоиономерными цементами
5)		реставрация компомерами

Задание №23

В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных факторов вероятнее всего приведет к поражению режущего края резцов и клыков:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		от 1 года до 3 лет
2)		от 3 до 4 лет
3)		от 6 мес. до 1 года
4)		в период внутриутробного развития
5)		в 7-8 лет

Задание №24

Зубы Пфлюгера являются разновидностью:

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		местной гипоплазии
2)		системной гипоплазии
3)		наследственных нарушений твердых тканей зубов
4)		воздействия лекарственных препаратов
5)		очаговой гипоплазии

Задание №25

В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных факторов вероятнее всего приведет к поражению рвущего бугра клыков:

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от 1 года до 3 лет
2)		от 3 до 4 лет
3)		до 1 года
4)		в период внутриутробного развития
5)		в 7-8 лет.

Задание №26

Количество участков поражения поверхности зубов при гипоплазии указывает на:

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		тяжесть перенесенного заболевания
2)		вид заболевания
3)		частоту заболеваний
4)		длительность заболевания
5)		возраст, в котором происходило нарушение минерального обмена

Задание №27

Какими пломбировочными материалами наиболее целесообразно проводить лечение зубов при гипоплазии:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		цинк-фосфатными цементами
2)		стеклоиономерными цементами
3)		силикатными цементами
4)		компомерами
5)		композитами

Задание №28

Какие особенности в строении временных зубов наиболее значимы в процессе возникновения кариеса временных зубов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		широкие дентинные канальцы
2)		тонкий слой дентина
3)		менее минерализованные твердые ткани зуба
4)		менее выраженные фиссуры
5)		все перечисленное верно

Задание №29		
Какие из названных симптомов характерны для хронического течения кариеса зубов у детей:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		дентин размягчен, не пигментирован
2)		дентин плотный, пигментирован
3)		системное поражение
4)		кариозные поражения единичные
5)		зондирование кариозной полости слабо болезненно

Задание №30		
Каковы особенности лечения зубов у детей с декомпенсированной формой кариеса:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		возможность оставить слой деминерализованного дентина на дне кар. полости
2)		обработка теплыми растворами антисептиков
3)		пломбирование кариозной полости композитом
4)		отсроченное пломбирование
5)		применение общей реминерализующей терапии

Задание №31		
Укажите сроки прорезывания постоянных зубов:		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		6 (5, 5-6 л), 1 (7-8 л), 2 (8-9 л), 4, 5 (10-11 л), 3 (10-12 л), 7 (14-15 л)
2)		6 (5, 5-6 л), 1 (7-8 л), 2 (8-9 л), 4 (9-11 л), 5, 3 (11-13 л), 7 (12-14 л)
3)		1 (6-7л), 2 (7-8л), 3 (10-13л), 4 (9-10л), 5 (10-11л), 6 (5, 5-6л), 7 (12-13л)

Задание №32		
Укажите места интенсивного дентинопоза в период формирования зуба:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		область рогов пульпы

2)		зона экватора
3)		зона роста
4)		фиссуры
5)		боковые поверхности корня

Задание №33

Когда заканчивается формирование корней временных резцов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		к 1 году
2)		к 1, 5 годам
3)		к 2-м годам
4)		к 3-м годам
5)		к 5-ти годам

Задание №34

Когда заканчивается формирование корней временных клыков:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		в 2 года
2)		в 2,5 года
3)		в 3 года
4)		в 4 года
5)		в 5 лет

Задание №35

Закладка каких постоянных зубов начинается во внутриутробный период:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		1
2)		2
3)		3
4)		5
5)		6

Задание №36

Когда считаются сформированными корни клыков:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		10-12 лет;
2)		12-13 лет

3)		11-13 лет
4)		13-15 лет
5)		15-16 лет

Задание №37

Когда заканчивается формирование корней второго моляра:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		10 лет
2)		13 лет
3)		14 лет
4)		15 лет
5)		14-16 лет

Задание №38

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 1 году:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		1
2)		3
3)		4
4)		6
5)		8

Задание №39

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 2 годам:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		4
2)		6
3)		8
4)		10
5)		16

Задание №40

Порядок прорезывания временных зубов:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I-II-III-IV-V
2)		I-II-IV-III-V
3)		II-I- III-IV-V

Задание №41

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|---------------------------|
| 1) | эрозия зубов |
| 2) | зубы Турнера |
| 3) | клиновидные дефекты зубов |
| 4) | флюороз |
| 5) | зубы Фурнье. |

Задание №42

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1) | местная гипоплазия |
| 2) | патологическая стираемость |
| 3) | гиперестезия |
| 4) | клиновидные дефекты |
| 5) | флюороз |

Задание №43

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания зубов?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1) | зубы Турнера |
| 2) | патологическая стираемость |
| 3) | некроз зубов |
| 4) | эрозии эмали |
| 5) | зубы Пфлюгера |

Задание №44

Причинами системной гипоплазии временных зубов могут являться:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | заболевания ребенка на 2-3-м году жизни |
| 2) | болезни матери в течение беременности |
| 3) | травма молочных зубов |
| 4) | искусственное вскармливание ребенка |
| 5) | гестоз второй половины беременности |

Задание №45

Площадь поражения вестибулярной поверхности зубов при гипоплазии наиболее достоверно указывает на:

Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		вид заболевания
2)		длительность заболевания
3)		время возникновения заболевания
4)		тяжесть перенесенного заболевания

Задание №46		
Причинами возникновения системной гипоплазии постоянных зубов могут являться:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		гестоз беременности
2)		эндокринные заболевания матери
3)		заболевания ребенка в первый год жизни
4)		прием лекарственных препаратов в первые годы жизни

Задание №47		
Причиной возникновения системной гипоплазии постоянных первых моляров и резцов является:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		гестоз второй половины беременности;
2)		заболевания ребенка в первый год жизни
3)		гестоз первой половины беременности
4)		прием тетрациклина

Задание №48		
В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных факторов вероятнее всего приведет к поражению жевательной поверхности премоляров и вторых моляров?		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от 1 года до 3 лет
2)		от 3 до 4 лет
3)		до 1 года
4)		в период внутриутробного развития
5)		в 7-8 лет

Задание №49		
В патогенезе гипоплазии ведущим фактором является:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		дисминерализация
2)		демнерализация
3)		разрушение белков эмали

4)		все перечисленное верно
----	--	-------------------------

Задание №50

Зубы Гетчинсона являются разновидностью:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		системной гипоплазии
2)		местной гипоплазии
3)		наследственных нарушений твердых тканей зубов
4)		лекарственных поражений
5)		очаговой гипоплазии