

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств
для оценки сформированности компетенций (части компетенций)
при аттестации по итогам освоения дисциплины

***Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и
проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля***

для студентов 1 и 2 курса,

направление подготовки (специальность)

31.02.01 Лечебное дело

квалификация: фельдшер,

на базе среднего общего образования программа: 2 года 10 месяцев

форма обучения
очная

Образовательная программа, реализуется ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по направлению подготовки 31.02.01 Лечебное дело (уровень среднего профессионального образования), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04 июля 2022 г., № 526, профессионального стандарта «Об утверждении профессионального стандарта «Фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г., № 470н. Рабочая программа составлена с учётом примерной основной образовательной программы (ПООП), утвержденной Приказом № П-41 от 28 февраля 2022 г. Минпросвещения России и ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ протокол № 3 от «19» октября 2023 года.) и учебного плана специальности 31.02.01 Лечебное дело.

Компетенция	Номера заданий в тестовой форме
ОК 01	1-4/1-2
ОК 02	5-8/3-4
ОК 04	9-12/5-6
ОК 05	13-16/7-8
ОК 06	17-20/9-10
ОК 09	21-24/11-12
ПК 2.1.	25-28/13-14
ПК 2.2.	29-32/15-16
ПК 2.3.	33-36/17-18
ПК 2.4.	37-40/19-20

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 2.1. Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.

ПК 2.2. Назначить и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений.

ПК 2.3. Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента.

ПК 2.4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами.

Оценочные средства для текущего контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)
	1. Первое прикладывание к груди матери здоровых новорожденных проводится обычно: А) Сразу после рождения Б) Через 6 ч после рождения В) Через 8 ч после рождения Г) Через 12 ч после рождения Ключ: А
	2. Основным критерием живорождения является: А) Масса плода 1000 г и более Б) Рост плода 35 см и более В) Наличие сердцебиения Г) Наличие самостоятельного дыхания Ключ: Г
	Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)
	3. Укажите факторы, которые способствуют возникновению гипотонических кровотечений при переносенной беременности: А) Затяжное течение родов Б) Крупный плод В) Слабость родовой деятельности Г) Нарушение процессов отделения плаценты Д) Разрывы влагалища и промежности Ключ: А, Б, В
	Тестовые задания на установление соответствия
	4. Установите соответствие между признаками отделения плаценты и их авторами: 1. Альфельд А. Пуговина при глубоком вдохе не втягивается 2. Шредер Б. Лигатура от половой щели опускается на 10 см 3. Клейн В. Изменения формы матки в виде песочных часов

	<p>4. Кюстнер-Чукалов Г. Удлинение и отсутствие втяжения пуповины после натуживания</p> <p>5. Довженко Д. Отсутствие втяжения пуповины при надавливании ребром ладони</p> <p>Ключ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–Д, 5–А</p>
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>5. При использовании В-адреномиметиков усиление кислородного снабжения плода достигается, когда:</p> <p>А) Токолитический эффект преобладает над гипотензией</p> <p>Б) Гиперкоагуляция в сосудах плаценты сменяется гипокоагуляцией</p> <p>В) Происходит все перечисленное</p> <p>Г) Ничего из перечисленного</p> <p>Ключ: А</p> <p>6. К материнской смертности относится смертность женщины:</p> <p>А) От медицинского аборта</p> <p>Б) От внематочной беременности</p> <p>В) От деструктирующего пузырного заноса</p> <p>Г) От всего перечисленного</p> <p>Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>7. Критические состояния у беременных, требующие обязательной госпитализации:</p> <p>А) Эклампсия</p> <p>Б) ОРВИ</p> <p>В) HELLP-синдром</p> <p>Г) Анемия 2-3 степени</p> <p>Д) Сахарный диабет 2 типа</p> <p>Ключ: А, В, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>8. Установите правильную последовательность действий при начавшемся послеродовом кровотечении:</p> <p>А) Определение причин кровотечения</p> <p>Б) Ручное обследование матки</p> <p>В) Начало утеротонической терапии</p> <p>Г) Инфузионно-трансфузионная терапия</p> <p>Д) Манипуляции (установка второго внутривенного катетера, кислородотерапия, катетеризация)</p>

	мочевого пузыря, мониторинг жизненных функций) Е) Лабораторные исследования Ключ: Д, Е, А, Б, В, Г
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. К материнской смертности относится смертность женщины: А) От медицинского аборта Б) От внематочной беременности В) От деструирующего пузырного заноса Г) От всего перечисленного Ключ: Г</p> <p>10. Первый период физиологических родов заканчивается всегда: А) Возникновением потуг Б) Полным раскрытием шейки матки В) Излитием околоплодных вод Г) Через 6-8 ч от начала регулярных схваток Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>11. При надвлагалищной ампутации матки с придатками, как правило, пересекают: А) Обе круглые связки Б) Обе воронко-тазовые связки В) Обе маточные трубы (маточные концы их) Г) Обе собственно яичниковые связки Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>12. Установите правильную последовательность уровней регуляции менструального цикла (иерархию), начиная с наивысшего: А) Гипофиз Б) Экстрагипоталамические церебральные структуры (лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело) В) Яичники Г) Органы и ткани-мишени (половые органы, молочные железы, волосяные фолликулы, кожа, кости и</p>

	др.) Д) Гипоталамус Ключ: Б, Д, А, В, Г						
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (одиночный выбор)</p> <p>13. Под периодическими медицинскими осмотрами женщин подразумевается осмотр: А) Декретированных контингентов при поступлении на работу Б) Контингентов работающих во вредных условиях производства В) Беременных, состоящих на диспансерном учете Г) Все ответы правильны Ключ: А, Б</p> <p>14. Показанием к применению токолитиков во время беременности является: А) Угроза выкидыша в I триместре беременности Б) Сахарный диабет В) Все ответы правильны Г) Все ответы неправильны Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>15. Потуги при физиологических родах начинаются, когда: А) Головка плода вставилась большим сегментом во входе в малый таз Б) Произошло полное раскрытие шейки матки В) Головка плода установилась на тазовом дне Г) Все ответы правильны Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>16. Установите соответствие между методами выделения последа и их авторами:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Гентер</td> <td>А. Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди</td> </tr> <tr> <td>2. Абуладзе</td> <td>Б. Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться</td> </tr> <tr> <td>3. Креде-Лазаревича</td> <td>В. Кулаками обеих рук надавливают на дно матки</td> </tr> </table> <p>Ключ: 1–В, 2–Б, 3–А</p>	1. Гентер	А. Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди	2. Абуладзе	Б. Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться	3. Креде-Лазаревича	В. Кулаками обеих рук надавливают на дно матки
1. Гентер	А. Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди						
2. Абуладзе	Б. Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться						
3. Креде-Лазаревича	В. Кулаками обеих рук надавливают на дно матки						

<p>ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (одиночный выбор)</p> <p>17. Подготовительные схватки отличаются от родовых: А) Нерегулярностью и редкими интервалами Б) Безболезненностью В) Отсутствием структурных изменений шейки матки Г) Всем перечисленным Ключ: Г</p> <p>18. При отсутствии эффекта реанимацию новорожденного прекращают: А) Через 15-20 мин Б) При отсутствии электрической активности мозга В) При отсутствии роговичного рефлекса и реакции зрачков на свет Г) Все ответы правильны Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>19. При нормальной беременности наступают следующие изменения в сердечно-сосудистой системе матери: А) Увеличение сердечного выброса на 40% Б) Некоторое повышение сосудистого тонуса В) Тахикардия Г) Умеренная гипертрофия левого желудочка Д) Все ответы правильны Ключ: А, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>20. Установите правильную последовательность действий при начавшемся послеродовом кровотечении: А) Определение причин кровотечения Б) Ручное обследование матки В) Начало утеротонической терапии Г) Инфузионно-трансфузионная терапия Д) Манипуляции (установка второго внутривенного катетера, кислородотерапия, катетеризация мочевого пузыря, мониторинг жизненных функций)</p>
--	--

	<p>Е) Лабораторные исследования Ключ: Д, Е, А, Б, В, Г</p>
<p>ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>21. Физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам проводят все, кроме: А) Врача акушера-гинеколога участка Б) Любого из врачей акушеров-гинекологов женской консультации В) Специально подготовленной акушерки Г) Врача физиотерапевта Ключ: А</p> <p>22. Понятие "планирование семьи" включает мероприятия, которые помогают всему, кроме: А) Избежать нежелательной беременности Б) Регулировать интервалы между беременностями В) Производить на свет желанных детей Г) Снизить рождаемость Ключ: Г</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>23. Показания к гистерэктомии при продолжающемся послеродовом кровотечении: А) Имбибиция матки Б) Разрыв матки В) Выворот матки Г) Отсутствие сократительной способности матки Д) Матка сократилась, но продолжается наружное кровотечение Ключ: А, Г</p> <p>Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>24. Установите правильную последовательность стадий ДВС-синдрома: А) Коагулопатия потребления + тромбоцитопения Б) Гипокоагуляция В) Восстановительная или стадия исходов и осложнений Г) Гиперкоагуляция и агрегация форменных элементов крови Ключ: Г, А, Б, В</p>
ПК 2.1. Проводить обследование	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p>

<p>пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.</p>	<p>25. Промедол в терапевтических дозах обладает следующими свойствами: А) Антиагрегантными Б) Антигистаминными В) Анальгетирующими Г) Всеми перечисленными Ключ: В</p> <p>26. Основным недостатком эпидуральной анестезии является: А) Периферическая вазодилатация Б) Нарушение компенсаторной вазоконстрикции при невосполненной кровопотере В) Отсутствие болевого синдрома в условиях реальной угрозы разрыва матки Г) Все перечисленное Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>27. При нормальной беременности в пищеварительной системе у женщин имеют место следующие изменения: А) Повышается слюноотечение Б) Секреторная функция желудка и кишечника несколько снижается В) Возрастает функциональная нагрузка на печень Г) Атония и гипотония кишечника Д) Ничего из перечисленного Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>28. Установите правильную последовательность механизма родов при чисто ягодичном предлежании: А) Боковое сгибание поясничной части позвоночника плода Б) Внутренний поворот головки В) Внутренний поворот ягодиц Г) Сгибание головки Д) Боковое сгибание шейно-грудной части позвоночника Е) Внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища Ключ: В, А, Е, Д, Б, Г</p>
<p>ПК 2.2. Назначить и проводить</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p>

лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений

29. Наиболее частыми причинами поперечного положения плода являются:

- А) Многоводие
- Б) Седловидная матка
- В) Миома матки
- Г) Все ответы правильны
- Д) Все ответы неправильны

Ключ: Г

30. Для эклампсии характерно:

- А) Наличие тонических судорог
- Б) Наличие клонических судорог
- В) Отсутствие судорожного синдрома
- Г) Коматозное состояние
- Д) Все перечисленное

Ключ: Д

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

31. Укажите факторы, которые способствуют возникновению гипотонических кровотечений при переносимой беременности:

- А) Затяжное течение родов
- Б) Крупный плод
- В) Слабость родовой деятельности
- Г) Нарушение процессов отделения плаценты
- Д) Разрывы влагалища и промежности

Ключ: А, Б, В

Тестовые задания на последовательность действий

32. Установите правильную последовательность операции медицинского хирургического аборта (кюретаж):

- А) Вводят в полость матки маточный зонд для уточнения положения матки и измерения длины её полости.
- Б) Удаляют плодное яйцо с помощью кюреток и абортцанга. Абортцангом удаляют части плодного яйца.
- В) Обрабатывают наружные половые органы, влагалище и шейку матки раствором антисептика.

	<p>Г) Вводят расширители Гегара последовательно несколько дальше внутреннего зева. Введение расширителей способствует растяжению мышцы шейки матки. Если возникает трудность при введении расширителя последующего номера, возвращаются к предыдущему, захватывают пулевыми щипцами заднюю губу шейки матки и удерживают расширитель в шейке матки в течение некоторого времени.</p> <p>Д) Берут шейку матки пулевыми щипцами за переднюю губу. Переднее зеркало удаляют, заднее передают ассистенту, сидящему слева. Для выпрямления шейечного канала шейку подтягивают книзу и кзади (при положении матки в anteflexio) или кпереди (при положении матки в retroflexio).</p> <p>Е) Вводят зеркала во влагалище.</p> <p>Ключ: В, Е, Д, Г, А, Б</p>
<p>ПК 2.3. Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>33. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании плода точками фиксации, как правило, являются:</p> <p>А) Надпереносица Б) Верхняя челюсть В) Затылочный бугор Г) Подзатылочная ямка</p> <p>Ключ: А</p> <p>34. Базальной частотой сердечных сокращений (ЧСС) плода называется:</p> <p>А) Средняя ЧСС, сохраняющаяся неизменной за период 10 мин и более Б) ЧСС при повышении внутриматочного давления в схватку В) Число осцилляций за 10 мин исследования Г) Ничего из перечисленного</p> <p>Ключ: А</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>35. Для лечения женского бесплодия при непроходимости маточных труб чаще всего применяют следующие операции:</p> <p>А) Сальпинголизис Б) Сальпингостомию В) Имплантацию маточных труб в матку Г) Метропластику</p> <p>Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p>

	<p>36. Установите соответствие между признаками и патологическими состояниями:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Предлежание плаценты</td><td>А. Сопровождается болью</td></tr> <tr> <td>2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты</td><td>Б. Кровяные выделения появляются внезапно</td></tr> <tr> <td></td><td>В. Тонус матки не повышен</td></tr> <tr> <td></td><td>Г. Как правило, не сопровождается болью</td></tr> <tr> <td></td><td>Д. Гипертонус матки</td></tr> <tr> <td></td><td>Е. Гипоксия плода</td></tr> </table> <p>Ключ: 1 – Б, В, Г; 2 – А, Д, Е</p>	1. Предлежание плаценты	А. Сопровождается болью	2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты	Б. Кровяные выделения появляются внезапно		В. Тонус матки не повышен		Г. Как правило, не сопровождается болью		Д. Гипертонус матки		Е. Гипоксия плода
1. Предлежание плаценты	А. Сопровождается болью												
2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты	Б. Кровяные выделения появляются внезапно												
	В. Тонус матки не повышен												
	Г. Как правило, не сопровождается болью												
	Д. Гипертонус матки												
	Е. Гипоксия плода												
<p>ПК 2.4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>37. Предлежание плода - это отношение:</p> <p>А) Головки плода ко входу в таз</p> <p>Б) Тазового конца плода ко входу в малый таз</p> <p>В) Наиболее низколежащей части плода ко входу в таз</p> <p>Г) Головки плода ко дну матки</p> <p>Ключ: В</p> <p>38. Окружность живота измеряется:</p> <p>А) На середине расстояния между пупком и мечевидным отростком</p> <p>Б) На уровне пупка</p> <p>В) На 3 п/п ниже пупка</p> <p>Г) На 2 п/п выше пупка</p> <p>Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>39. Под периодическими медицинскими осмотрами женщин подразумевается осмотр:</p> <p>А) Декретированных контингентов при поступлении на работу</p> <p>Б) Контингентов работающих во вредных условиях производства</p> <p>В) Беременных, состоящих на диспансерном учете</p> <p>Г) Все ответы правильны</p> <p>Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>40. Установите соответствие между методами выделения последа и их авторами:</p>												

	1. Гентер 2. Абуладзе 3. Креде-Лазаревича Ключ: 1–В, 2–Б, 3–А	А. Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди Б. Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться В. Кулаками обеих рук надавливают на дно матки
--	--	---

Оценочные средства для промежуточного контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Окружность живота измеряется: А) На середине расстояния между пупком и мечевидным отростком Б) На уровне пупка В) На 3 п/п ниже пупка Г) На 2 п/п выше пупка Ключ: Б</p> <p>2. Установлен диагноз: Роды первые срочные. Первый период родов. Чисто ягодичное предлежание плода. Раннее излитие околоплодных вод. Выпадение пуповины. Показано срочное окончание родов с помощью операции ... А) Перинеотомии Б) Экстракции плода за тазовый конец В) Кесарева сечения Г) Акушерских щипцов Ключ: В</p>
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	<p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>3. Для лактостаза характерно: А) Умеренное нагрубание молочных желез Б) Повышение температуры тела с ознобом В) Свободное отделение молока Г) Значительное равномерное нагрубание молочных желез Ключ: Б, Г</p> <p>4. Развитие клинически узкого таза может привести к:</p>

	<p>А) Разрыву матки Б) Образованию урогенитальных свищей В) Гибели плода Г) Всем указанным осложнениям Ключ: А, В</p>
<p>ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>5. Перво- и повторно беременные начинают ощущать шевеления плода соответственно с...</p> <p>А) 16 и 14 недель Б) 18 и 16 недель В) 20 и 18 недель Г) 22 и 20 недель Ключ: В</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>6. Наиболее частыми причинами поперечного положения плода являются:</p> <p>А) Многоводие Б) Седловидная матка В) Миома матки Г) Срок беременности Ключ: А, Б, В</p>
<p>ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>7. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар не включает:</p> <p>А) Частоту сердцебиения Б) Частоту дыхания В) Состояние зрачков Г) Мышечный тонус Ключ: В</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>8. Под периодическими медицинскими осмотрами женщин подразумевается осмотр:</p> <p>А) Декретированных контингентов при поступлении на работу Б) Контингентов работающих во вредных условиях производства В) Беременных, состоящих на диспансерном учете Г) Все ответы правильны</p>

	Ключ: А, Б
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	<p align="center">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>9. При нормальной беременности наступают следующие изменения в сердечно-сосудистой системе матери: А) Увеличение сердечного выброса на 40% Б) Некоторое повышение сосудистого тонуса В) Тахикардия Г) Умеренная гипертрофия левого желудочка Д) Все ответы правильны Ключ: А, Г</p> <p align="center">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>10. Установите правильную последовательность действий при дистоции плечиков плода: А) Эпизиотомия (при необходимости, для увеличения пространства) Б) Прием МакРобертса (резкое сгибание бедер матери к животу) В) Попытка рождения заднего плечика (давление на надлобковую область, ротация плечиков) Г) Оценка ситуации, определение наличия дистоции плечиков Д) Рождение заднего плечика, а затем переднего Ключ: Г, Б, А, В, Д</p>
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	<p align="center">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>11. Установите правильную последовательность уровней регуляции менструального цикла (иерархию), начиная с наивысшего: А) Гипофиз Б) Экстрагипоталамические церебральные структуры (лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело) В) Яичники Г) Органы и ткани-мишени (половые органы, молочные железы, волосяные фолликулы, кожа, кости и др.) Д) Гипоталамус Ключ: Б, Д, А, В, Г</p> <p>12. Установите правильную последовательность операции медицинского хирургического аборта (кюретаж): А) Вводят в полость матки маточный зонд для уточнения положения матки и измерения длины её</p>

	<p>полости.</p> <p>Б) Удаляют плодное яйцо с помощью кюреток и абортцанга. Абортцангом удаляют части плодного яйца.</p> <p>В) Обрабатывают наружные половые органы, влагалище и шейку матки раствором антисептика.</p> <p>Г) Вводят расширители Гегара последовательно несколько дальше внутреннего зева. Введение расширителей способствует растяжению мышцы шейки матки. Если возникает трудность при введении расширителя последующего номера, возвращаются к предыдущему, захватывают пулевыми щипцами заднюю губу шейки матки и удерживают расширитель в шейке матки в течение некоторого времени.</p> <p>Д) Берут шейку матки пулевыми щипцами за переднюю губу. Переднее зеркало удаляют, заднее передают ассистенту, сидящему слева. Для выпрямления шейного канала шейку подтягивают книзу и кзади (при положении матки в anteflexio) или кпереди (при положении матки в retroflexio).</p> <p>Е) Вводят зеркала во влагалище.</p> <p>Ключ: В, Е, А, Г, Д, Б</p>
<p>ПК 2.1. Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>13. Прием Морисо-Левре...</p> <p>А) Используется в классическом ручном пособии</p> <p>Б) Применяется для выведения ручек и головки</p> <p>В) Применяется для выведения головки при тазовых предлежаниях плода в случае отсутствия самопроизвольного продвижения плода по родовому каналу</p> <p>Г) Все верно</p> <p>Ключ: А</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>14. Установите правильную последовательность механизма родов при чисто ягодичном предлежании:</p> <p>А) Боковое сгибание поясничной части позвоночника плода</p> <p>Б) Внутренний поворот головки</p> <p>В) Внутренний поворот ягодиц</p> <p>Г) Сгибание головки</p> <p>Д) Боковое сгибание шейно-грудной части позвоночника</p> <p>Е) Внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища</p> <p>Ключ: В, А, Е, Д, Б, Г</p>
<p>ПК 2.2. Назначить и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>15. При нормальной беременности в пищеварительной системе у женщин имеют место следующие изменения:</p>

<p>обострений, травм и отравлений</p>	<p>А) Повышается слюноотечение Б) Секреторная функция желудка и кишечника несколько снижается В) Возрастает функциональная нагрузка на печень Г) Атония и гипотония кишечника Д) Ничего из перечисленного Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>16. Установите правильную последовательность механизма родов при чисто ягодичном предлежании: А) Боковое сгибание поясничной части позвоночника плода Б) Внутренний поворот головки В) Внутренний поворот ягодиц Г) Сгибание головки Д) Боковое сгибание шейно-грудной части позвоночника Е) Внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища Ключ: В, А, Е, Д, Б, Г</p>
<p>ПК 2.3. Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>17. У беременной с хронической артериальной гипертензией наиболее частым осложнением является: А) Самопроизвольный выкидыш Б) Преждевременные роды В) Перенашивание беременности Г) Преэклампсия Ключ: Г</p> <p>18. Основным критерием живорождения является: А) Масса плода 1000 г и более Б) Рост плода 35 см и более В) Наличие сердцебиения Г) Наличие самостоятельного дыхания Ключ: Г</p>
<p>ПК 2.4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>19. Согласно регионализации перинатальной помощи, к 1-му уровню родовспомогательных учреждений относится: А) Перинатальный центр</p>

Б) Городской родильный дом
В) Центральная районная больница
Г) Сельская врачебная амбулатория
Ключ: В

20. Предлежание плода - это отношение:

А) Головки плода ко входу в таз
Б) Тазового конца плода ко входу в малый таз
В) Наиболее низколежащей части плода ко входу в таз
Г) Головки плода ко дну матки
Ключ: В

