

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств
для оценки сформированности компетенций (части компетенций)
при промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

***Учебная практика по диагностике и лечению
заболеваний акушерско-гинекологического профиля***

для студентов ____1-2____ курса,

направление подготовки (специальность)

31.02.01. Лечебное дело,

квалификация: фельдшер,

на базе среднего общего образования программа: 1 год 10 месяцев

форма обучения
очная

Образовательная программа, реализуется ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по направлению подготовки 31.02.01 Лечебное дело (уровень среднего профессионального образования), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04 июля 2022 г., № 526, профессионального стандарта «Об утверждении профессионального стандарта «Фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г., № 470н. Рабочая программа составлена с учётом примерной основной образовательной программы (ПООП), утвержденной Приказом № П-41 от 28 февраля 2022 г. Минпросвещения России и ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ протокол № 3 от «19» октября 2023 года.) и учебного плана специальности 31.02.01 Лечебное дело.

Компетенция	Номера заданий в тестовой форме
ОК 01	1-4/1-2
ОК 02	5-8/3-4
ОК 04	9-12/5-6
ОК 05	13-16/7-8
ОК 06	17-20/9-10
ОК 09	21-24/11-12
ПК 2.1	25-28/13-14
ПК 2.2.	29-32/15-16
ПК 2.3.	33-36/17-18
ПК 2.4.	37-40/19-20

ОК 01- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02- Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04- Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 09 -Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 2.1. -Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.

ПК 2.2.- Назначить и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений

ПК 2.3.- Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента

ПК 2.4.- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами

Оценочные средства для текущего контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
<p>ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Первое прикладывание к груди матери здоровых новорожденных проводится обычно: А) Сразу после рождения Б) Через 6 ч после рождения В) Через 8 ч после рождения Г) Через 12 ч после рождения Ключ: А</p> <p>2. Основным критерием живорождения является: А) Масса плода 1000 г и более Б) Рост плода 35 см и более В) Наличие сердцебиения Г) Наличие самостоятельного дыхания Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>3. Укажите факторы, которые способствуют возникновению гипотонических кровотечений при перенесенной беременности: А) Затяжное течение родов Б) Крупный плод В) Слабость родовой деятельности Г) Нарушение процессов отделения плаценты Д) Разрывы влагалища и промежности Ключ: А, Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p>

	<p>4. Установите соответствие между лекарственным препаратом (1-4) и его основным действием/применением (А-Г) в акушерской практике:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Препарат</th><th>Действие/Применение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Окситоцин</td><td>А. Профилактика и лечение анемии</td></tr> <tr> <td>2. Сульфат магния</td><td>Б. Утеротоническое средство (усиление сокращений матки)</td></tr> <tr> <td>3. Препараты железа</td><td>В. Токолитическое средство (снижение сократительной активности матки)</td></tr> <tr> <td>4. Гексопреналин (Гинипрал)</td><td>Г. Противосудорожное средство при преэклампсии/эклампсии</td></tr> </tbody> </table> <p>Ключ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В.</p>	Препарат	Действие/Применение	1. Окситоцин	А. Профилактика и лечение анемии	2. Сульфат магния	Б. Утеротоническое средство (усиление сокращений матки)	3. Препараты железа	В. Токолитическое средство (снижение сократительной активности матки)	4. Гексопреналин (Гинипрал)	Г. Противосудорожное средство при преэклампсии/эклампсии
Препарат	Действие/Применение										
1. Окситоцин	А. Профилактика и лечение анемии										
2. Сульфат магния	Б. Утеротоническое средство (усиление сокращений матки)										
3. Препараты железа	В. Токолитическое средство (снижение сократительной активности матки)										
4. Гексопреналин (Гинипрал)	Г. Противосудорожное средство при преэклампсии/эклампсии										
<p>ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>5. При использовании В-адреномиметиков усиление кислородного снабжения плода достигается, когда:</p> <p>А) Токолитический эффект преобладает над гипотензией Б) Гиперкоагуляция в сосудах плаценты сменяется гипокоагуляцией В) Происходит все перечисленное Г) Ничего из перечисленного</p> <p>Ключ: А</p> <p>6. К материнской смертности относится смертность женщины:</p> <p>А) От медицинского аборта Б) От внематочной беременности В) От деструктирующего пузырного заноса Г) От всего перечисленного</p> <p>Ключ: Г</p>										

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

7. Критические состояния у беременных, требующие обязательной госпитализации: (Выберите ВСЕ верные варианты)

- А) Эклампсия
- Б) ОРВИ
- В) HELLP-синдром
- Г) Анемия 2-3 степени
- Д) Сахарный диабет 2 типа

Ключ: А, В, Г

Тестовые задания на установление соответствия

8. Установите соответствие между степенью разрыва промежности (1-4) и анатомическими структурами, которые при этом повреждаются (А-Г):

Степень разрыва	Повреждаемые структуры
--------------------	------------------------

1. I степень	А. Кожа промежности, подкожная клетчатка, мышцы промежности, сфинктер заднего прохода и слизистая прямой кишки
--------------	--

2. II степень	Б. Кожа промежности, подкожная клетчатка и мышцы промежности
------------------	--

3. III	В. Кожа промежности и подкожная клетчатка
--------	---

	<p>степень</p> <hr/> <p>4. IV Г. Кожа промежности, подкожная клетчатка, мышцы степень промежности и сфинктер заднего прохода</p> <hr/> <p>Ключ: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А.</p>
<p>ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. К материнской смертности относится смертность женщины: А) От медицинского аборта Б) От внематочной беременности В) От деструирующего пузырного заноса Г) От всего перечисленного Ключ: Г</p> <p>10. Первый период физиологических родов заканчивается всегда: А) Возникновением потуг Б) Полным раскрытием шейки матки В) Излитием околоплодных вод Г) Через 6-8 ч от начала регулярных схваток Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>11. При надвлагалищной ампутации матки с придатками, как правило, пересекают: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Обе круглые связки Б) Обе воронко-тазовые связки В) Обе маточные трубы (маточные концы их)</p>

	<p>Г) Обе собственно яичниковые связки Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>12. Установите правильную последовательность действий при проведении операции кесарева сечения (основные этапы): А) Извлечение плода Б) Ушивание матки В) Разрез брюшной стенки Г) Ушивание брюшной стенки послойно Д) Извлечение последа и ревизия полости матки Е) Разрез на матке Ключ: В, Е, А, Д, Б, Г</p>
<p>ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>13. Под периодическими медицинскими осмотрами женщин подразумевается осмотр: А) Декретированных контингентов при поступлении на работу Б) Контингентов работающих во вредных условиях производства В) Беременных, состоящих на диспансерном учете Г) Все ответы правильны Ключ: Г</p> <p>14. Показанием к применению токолитиков во время беременности является: А) Угроза выкидыша в I триместре беременности Б) Сахарный диабет В) Все ответы правильны Г) Все ответы неправильны Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>15. Потуги при физиологических родах начинаются, когда: (Выберите ВСЕ верные варианты)</p>

	<p>А) Головка плода встала большим сегментом во входе в малый таз Б) Произошло полное раскрытие шейки матки В) Головка плода установилась на тазовом дне Г) Все ответы правильны Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>16. Установите соответствие по методам выделения последа и их авторами:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Гентер</td><td>А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди</td></tr> <tr> <td>2. Абуладзе</td><td>Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться</td></tr> <tr> <td>3. Кредо-Лазаревича</td><td>В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки</td></tr> </table> <p>Ключ: 1-В, 2-Б, 3-А</p>	1. Гентер	А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди	2. Абуладзе	Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться	3. Кредо-Лазаревича	В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки
1. Гентер	А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди						
2. Абуладзе	Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться						
3. Кредо-Лазаревича	В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки						
<p>ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>17. Подготовительные схватки отличаются от родовых:</p> <p>А) Нерегулярностью и редкими интервалами Б) Безболезненностью В) Отсутствием структурных изменений шейки матки Г) Всем перечисленным Ключ: Г</p> <p>18. При отсутствии эффекта реанимацию новорожденного прекращают:</p> <p>А) Через 15-20 мин Б) При отсутствии электрической активности мозга В) При отсутствии роговичного рефлекса и реакции зрачков на свет Г) Все ответы правильны Ключ: Г</p>						

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

19. При нормальной беременности наступают следующие изменения в сердечно-сосудистой системе матери: (Выберите ВСЕ верные варианты)

- А) Увеличение сердечного выброса на 40%
- Б) Некоторое повышение сосудистого тонуса
- В) Тахикардия
- Г) Умеренная гипертрофия левого желудочка
- Д) Все ответы правильны

Ключ: А, Г

Тестовые задания на установление соответствия

20. Установите соответствие между фактором риска (1-4) и наиболее вероятной ассоциированной акушерской патологией (А-Г):

Фактор риска	Ассоциированная патология
1. Возраст первородящей старше 35 лет	А. Многоводие
2. Сахарный диабет у матери	Б. Хромосомные аномалии плода
3. Перенесенный тяжелый гестоз в анамнезе	В. Внутриутробная задержка роста плода (ВЗРП)
4. Хроническая внутриутробная инфекция	Г. Преэклампсия (высокий риск повторения)

Ключ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В.

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)

21. Физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам проводят все, кроме:

языках	<p>А) Врача акушера-гинеколога участка Б) Любого из врачей акушеров-гинекологов женской консультации В) Специально подготовленной акушерки Г) Врача физиотерапевта Ключ: Г</p> <p>22. Понятие "планирование семьи" включает мероприятия, которые помогают всему, кроме: А) Избежать нежелательной беременности Б) Регулировать интервалы между беременностями В) Производить на свет желанных детей Г) Снизить рождаемость Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>23. Показания к гистерэктомии при продолжающемся послеродовом кровотечении: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Имбибиция матки Б) Разрыв матки В) Выворот матки Г) Отсутствие сократительной способности матки Д) Матка сократилась, но продолжается наружное кровотечение Ключ: А, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>24. Установите соответствие между степенью зрелости плаценты по Grannum (1-4) и примерным сроком беременности, когда она обычно встречается (А-Г):</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Степень зрелости плаценты</td> <td style="width: 50%;">Срок беременности (недели)</td> </tr> </table>	Степень зрелости плаценты	Срок беременности (недели)
Степень зрелости плаценты	Срок беременности (недели)		

	<p>1. 0 степень А. 36-39</p> <hr/> <p>2. I степень Б. До 20-22</p> <hr/> <p>3. II степень В. 22-34</p> <hr/> <p>4. III степень Г. 39-40 и более</p> <hr/> <p>Ключ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г.</p>
ПК 2.1. Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>25. Промедол в терапевтических дозах обладает следующими свойствами: А) Антиагрегантными Б) Антигистаминными В) Анальгетирующими Г) Всеми перечисленными Ключ: В</p> <p>26. Основным недостатком эпидуральной анестезии является: А) Периферическая вазодилатация Б) Нарушение компенсаторной вазоконстрикции при невосполненной кровопотере В) Отсутствие болевого синдрома в условиях реальной угрозы разрыва матки Г) Все перечисленное Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>27. При нормальной беременности в пищеварительной системе у женщин имеют место следующие изменения: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Повышается слюноотечение Б) Секреторная функция желудка и кишечника несколько снижается В) Возрастает функциональная нагрузка на печень</p>

	<p>Г) Атония и гипотония кишечника Д) Ничего из перечисленного Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>28. Установите правильную последовательность действий при ведении пациентки с клинически узким тазом: А) Оценка признака Вастена (соответствие размеров головки плода и таза матери) Б) Динамическое наблюдение за течением родов, эффективностью схваток В) Констатация диагноза "клинически узкий таз" при положительном признаке Вастена и отсутствии продвижения головки Г) Проведение экстренного кесарева сечения Д) Влагалищное исследование, определение расположения головки плода Ключ: Д, Б, А, В, Г</p>
<p>ПК 2.2. Назначить и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>29. Наиболее частыми причинами поперечного положения плода являются: А) Многоводие Б) Седловидная матка В) Миома матки Г) Все ответы правильны Д) Все ответы неправильны Ключ: Г</p> <p>30. Для эклампсии характерно: А) Наличие тонических судорог Б) Наличие клонических судорог В) Отсутствие судорожного синдрома Г) Коматозное состояние Д) Все перечисленное Ключ: Д</p>

	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>31. Укажите факторы, которые способствуют возникновению гипотонических кровотечений при переносенной беременности: (Выберите ВСЕ верные варианты)</p> <p>А) Затяжное течение родов Б) Крупный плод В) Слабость родовой деятельности Г) Нарушение процессов отделения плаценты Д) Разрывы влагалища и промежности</p> <p>Ключ: А, Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>32. Установите правильную последовательность действий при проведении искусственного прерывания беременности (медицинского хирургического аборта - кюретажа):</p> <p>А) Вводят в полость матки маточный зонд для уточнения положения матки и измерения длины её полости Б) Удаляют плодное яйцо с помощью кюреток и абортцанга. Абортцангом удаляют части плодного яйца В) Обработывают наружные половые органы, влагалище и шейку матки раствором антисептика Г) Вводят расширители Гегара последовательно несколько дальше внутреннего зева. Введение расширителей способствует растяжению мышцы шейки матки. Если возникает трудность при введении расширителя последующего номера, возвращаются к предыдущему, захватывают пулевыми щипцами заднюю губу шейки матки и удерживают расширитель в шейке матки в течение некоторого времени Д) Берут шейку матки пулевыми щипцами за переднюю губу. Переднее зеркало удаляют, заднее передают ассистенту, сидящему слева. Для выпрямления шейечного канала шейку подтягивают книзу и кзади (при положении матки в anteflexio) или кпереди (при положении матки в retroflexio) Е) Вводят зеркала во влагалище</p> <p>Ключ: В, Е, Д, Г, А, Б</p>
<p>ПК 2.3. Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>33. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании плода точками фиксации, как правило, являются:</p> <p>А) Надпереносица</p>

пациента	<p>Б) Верхняя челюсть В) Затылочный бугор Г) Подзатылочная ямка Ключ: А</p> <p>34. Базальной частотой сердечных сокращений (ЧСС) плода называется: А) Средняя ЧСС, сохраняющаяся неизменной за период 10 мин и более Б) ЧСС при повышении внутриматочного давления в схватку В) Число осцилляций за 10 мин исследования Г) Ничего из перечисленного Ключ: А</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>35. Для лечения женского бесплодия при непроходимости маточных труб чаще всего применяют следующие операции: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Сальпинголизис Б) Сальпингостомию В) Имплантацию маточных труб в матку Г) Метропластику Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>36. Установите соответствие между анатомической формой таза (по классификации Кальдуэлл-Молоя) и ее клиническими характеристиками:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Форма таза</th><th style="text-align: left; width: 50%;">Клиническая характеристика</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Гинекоидный таз</td><td>А. Поперечно-суженный овал; часто ассоциируется с поперечными и</td></tr> </tbody> </table>	Форма таза	Клиническая характеристика	1. Гинекоидный таз	А. Поперечно-суженный овал; часто ассоциируется с поперечными и
Форма таза	Клиническая характеристика				
1. Гинекоидный таз	А. Поперечно-суженный овал; часто ассоциируется с поперечными и				

	<p style="text-align: center;">косыми положениями плода</p> <hr/> <p>2. Андроидный таз Б. Классический женский тип, округлый; оптимален для родов</p> <hr/> <p>3. Антропoidный таз В. Форма "сердца", сужение в заднем сегменте; высокий риск дистoции плечиков</p> <hr/> <p>4. Платипеллоидный таз Г. Продольно-удлиненный овал; головка плода может вставляться в прямом размере</p> <hr/> <p>Ключ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А.</p>
<p>ПК 2.4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>37. Предлежание плода - это отношение:</p> <p>А) Головки плода ко входу в таз</p> <p>Б) Тазового конца плода ко входу в малый таз</p> <p>В) Наиболее низколежащей части плода ко входу в таз</p> <p>Г) Головки плода ко дну матки</p> <p>Ключ: В</p> <p>38. Окружность живота измеряется:</p> <p>А) На середине расстояния между пупком и мечевидным отростком</p> <p>Б) На уровне пупка</p> <p>В) На 3 п/п ниже пупка</p> <p>Г) На 2 п/п выше пупка</p> <p>Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>39. Под периодическими медицинскими осмотрами женщин подразумевается осмотр: (Выберите ВСЕ верные варианты)</p> <p>А) Декретированных контингентов при поступлении на работу</p>

	<p>Б) Контингентов работающих во вредных условиях производства В) Беременных, состоящих на диспансерном учете Г) Все ответы правильны Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>40. Установите соответствие по методам выделения последа и их авторами:</p> <table> <tr> <td>1. Гентер</td><td>А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди</td></tr> <tr> <td>2. Абуладзе</td><td>Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться</td></tr> <tr> <td>3. Кредо-Лазаревича</td><td>В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки</td></tr> </table> <p>Ключ: 1-В, 2-Б, 3-А</p>	1. Гентер	А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди	2. Абуладзе	Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться	3. Кредо-Лазаревича	В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки
1. Гентер	А- Одновременно сжимают матку и надавливают на дно вниз и кпереди						
2. Абуладзе	Б- Берут переднюю брюшную стенку в продольную складку двумя руками и предлагают потужиться						
3. Кредо-Лазаревича	В- Кулаками обеих рук надавливают на дно матки						

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

<p>ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Окружность живота измеряется: А) На середине расстояния между пупком и мечевидным отростком Б) На уровне пупка В) На 3 п/п ниже пупка Г) На 2 п/п выше пупка Ключ: Б</p> <p>2. Установлен диагноз: Роды первые срочные. Первый период родов. Чисто ягодичное предлежание плода. Раннее излитие околоплодных вод. Выпадение пуповины. Показано срочное окончание родов с помощью операции: А) Перинеотомии Б) Экстракции плода за тазовый конец</p>
--	---

	<p>В) Кесарева сечения Г) Акушерских щипцов Ключ: В</p>
<p>ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>3. Для лактостаза характерно: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Умеренное нагрубание молочных желез Б) Повышение температуры тела с ознобом В) Свободное отделение молока Г) Значительное равномерное нагрубание молочных желез Ключ: Б, Г</p> <p>4. Развитие клинически узкого таза может привести к: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Разрыву матки Б) Образованию урогенитальных свищей В) Гибели плода Г) Всем указанным осложнениям Ключ: А, В</p>
<p>ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>5. Наиболее частыми причинами поперечного положения плода являются: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Многоводие Б) Седловидная матка В) Миома матки Г) Срок беременности Ключ: А, Б, В</p> <p>Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>6. Установите соответствие между клиническим показателем (1-4) и степенью тяжести преэклампсии (А-В):</p>

	<p>Показатель</p> <p>1. АД 140/90 мм рт. ст., протеинурия 0.3 г/л</p> <p>2. АД 160/110 мм рт. ст., протеинурия 5 г/л, головная боль</p> <p>3. АД 150/100 мм рт. ст., протеинурия 1 г/л, отеки</p> <p>4. Судорожный припадок</p> <p>Ключ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г.</p> <p>Степень преэклампсии</p> <p>А. Легкая степень</p> <p>Б. Средняя степень (Умеренная)</p> <p>В. Тяжелая степень</p> <p>Г. Эклампсия</p>
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>7. Продолжительность раннего послеродового периода:</p> <p>А) 24 ч</p> <p>Б) 2 ч</p> <p>В) 4 ч</p> <p>Г) 12 ч</p> <p>Ключ: А</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>8. Потуги при физиологических родах начинаются, когда: (Выберите ВСЕ верные варианты)</p> <p>А) Головка плода вставилась большим сегментом во входе в малый таз</p> <p>Б) Произошло полное раскрытие шейки матки</p> <p>В) Головка плода установилась на тазовом дне</p> <p>Г) Все ответы правильны</p> <p>Ключ: Б, В</p>
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. УЗИ в акушерстве позволяет определить:</p> <p>А) Расположение плаценты и ее патологию</p> <p>Б) Размеры плода</p>

<p>числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</p>	<p>В) Неразвивающуюся беременность Г) Все перечисленное Ключ: Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>10. При нормальной беременности наступают следующие изменения в сердечно-сосудистой системе матери: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Увеличение сердечного выброса на 40% Б) Некоторое повышение сосудистого тонуса В) Тахикардия Г) Умеренная гипертрофия левого желудочка Д) Все ответы правильны Ключ: А, Г</p>
<p>ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>11. При использовании В-адреномиметиков усиление кислородного снабжения плода достигается, когда: А) Токолитический эффект преобладает над гипотензией Б) Гиперкоагуляция в сосудах плаценты сменяется гипокоагуляцией В) Происходит все перечисленное Г) Ничего из перечисленного Ключ: А</p> <p>12. К материнской смертности относится смертность женщины: А) От медицинского аборта Б) От внематочной беременности В) От деструктирующего пузырного заноса Г) От всего перечисленного Ключ: Г</p>
<p>ПК 2.1. Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>13. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании плода точками фиксации, как правило, являются: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Надпереносица Б) Верхняя челюсть</p>

	<p>В) Затылочный бугор Г) Подзатылочная ямка Ключ: А, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>14. Укажите последовательность механизма родов при чисто ягодичном предлежании: А) Боковое сгибание поясничной части позвоночника плода Б) Внутренний поворот головки В) Внутренний поворот ягодиц Г) Сгибание головки Д) Боковое сгибание шейно-грудной части позвоночника Е) Внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища Ключ: В, А, Е, Д, Б, Г</p>
<p>ПК 2.2. Назначить и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>15. При нормальной беременности в пищеварительной системе у женщин имеют место следующие изменения: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Повышается слюноотечение Б) Секреторная функция желудка и кишечника несколько снижается В) Возрастает функциональная нагрузка на печень Г) Атония и гипотония кишечника Д) Ничего из перечисленного Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на последовательность действий</p> <p>16. Укажите последовательность механизма родов при чисто ягодичном предлежании: А) Боковое сгибание поясничной части позвоночника плода Б) Внутренний поворот головки В) Внутренний поворот ягодиц Г) Сгибание головки Д) Боковое сгибание шейно-грудной части позвоночника</p>

	<p>Е) Внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища Ключ: В, А, Е, Д, Б, Г</p>
<p>ПК 2.3. Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>17. У беременной с хронической артериальной гипертензией наиболее частым осложнением является: А) Самопроизвольный выкидыш Б) Преждевременные роды В) Перенашивание беременности Г) Преэклампсия Ключ: Г</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>18. Критические состояния у беременных, требующие обязательной госпитализации: (Выберите ВСЕ верные варианты) А) Эклампсия Б) ОРВИ В) HELLP-синдром Г) Анемия 2-3 степени Д) Сахарный диабет 2 типа Ключ: А, В, Г</p>
<p>ПК 2.4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>19. Согласно регионализации перинатальной помощи, к 1-му уровню родовспомогательных учреждений относится: А) Перинатальный центр Б) Городской родильный дом В) Центральная районная больница Г) Сельская врачебная амбулатория Ключ: В</p> <p>Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>20. Последовательность действий при гипотоническом послеродовом кровотечении. Расположите в</p>

	<p>правильной последовательности первоочередные действия врача при диагностике гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде (после рождения последа):</p>
--	---

А) Введение утеротонических препаратов (Окситоцин в/в капельно).

Б) Наружный массаж матки через переднюю брюшную стенку.

В) Опорожнение мочевого пузыря (катетеризация).

Г) Оценка общего состояния родильницы, объема кровопотери, вызов помощи.

Д) Ручное обследование полости матки (при продолжающемся кровотечении).

Ключ: Г, В, Б, А, Д.

